

Memoire

SUR.

L'Opération de la Hernie
Inguinale et de la Crurale.

Qui établit et prouve d'après l'Expérience
et la Théorie, que la dilatation graduée
et ménagée de l'anneau et de l'arcade
crurale, proposée par l'Auteur, est
préférable à la coupe, incision ou
débridement qu'on y pratique
Ordinairement.

Présenté à l'Académie Royale
de Chirurgie.

Par M. Le Blanc

L'abus que je me proposai dans le premier
d'observations que je communiquai à
l'Académie en 1752, étoit de prouver, d'après
l'Expérience, la possibilité de la dilatation
de l'anneau et de l'arcade Crurale, et
dans ce cas l'appréhension qu'elle devoit
avoir sur la coupe ou le débridement
prescrit par tous les auteurs qui ont
écrit sur cette opération. J'ai depuis



ARC 1421

Recueilli de nouvelles Observations qui
concourent à autoriser cette pratique. Le
Mémoire que j'ay l'honneur de présenter
aujourd'hui renferme ces mêmes observat^{ions},
appuies sur des principes tirés du
raisonnement. Une mauvaise Méthode
peut citer ses Expériences, ses Succès
mêmes; mais, l'Expérience ne peut être
constante qu'autant qu'elle est confirmée
par une Saine Théorie. j'Établiray, avec
le plus de précision qu'il me sera possible,
les raisons qui doivent déterminer à la
Dilatation. j'ay, en conséquence, divisé
ce Mémoire en trois Articles. le 1.^{er}
contient les Vues qu'on doit se proposer
dans l'opération. le 2.^e renferme les
expériences qui déterminent à Donner la
préférence à la Dilatation, et le 3.^e Vient
à l'appui, par le raisonnement ou la Théorie
pour en confirmer la validité.

Article 1.^{er}

Vues Principales qu'on doit
se proposer dans L'Opération

Les Vues principales qu'on doit

se propose dans l'opération consistent
principalement dans l'aggrandissement
du passage ou se fait l'étranglement
des parties qui forment la hernie, afin
de pouvoir les faire rentrer dans la
capacité du ventre, de leur y mettre en
liberté et par ce moyen faire cesser les
accidents qui menacent le malade d'une
mort prochaine.

Jusqu'icy, les maîtres de l'art ont
enseigné que pour procurer cet aggrandissement,
il falloit faire à l'anneau ou à l'arcade
crurale, un débriement, une coupe, ou
incision plus ou moins grande * pour
élargir ou aggrandir le passage, afin de
faire rentrer, avec facilité, les parties
sorties.

Les dangers attachés à cette coupe ont
jusqu'icy occupé les grands Chirurgiens,
et les ont portés à imaginer des
instruments propres à les éviter. De là,
sous Venise les différents crachés de
M. M. Le Daur et Petit, celui de
M. et Morand, sa sonde cannelée à
plaque, pour garantir l'intestin du
tranchant de l'instrument. L'expérience

* M. Sharp la prescriv d'un travers de ponce.



ayant fait connoître que ces Machines, quelque
quelque bien imaginées qu'elles fussent,
n'étoient point exemptes de Dangers
attachés au débrièvement, on leur a préféré
le simple bistouri boutonné. quelques
uns se servent encore avec succès de la
Sonde de M. Morand; d'autres n'employent,
pour Sonde et pour Conducteur, que le Doigt.

Tous Ceux qui ont lu sur
cette opération, prescrivent, dans tous les
cas, sans en excepter aucun, le
débrièvement, avec le tranchant de
l'instrument. Mais Est-il bien
Certain qu'il faille faire dans tous les
cas ce débrièvement? non assurément;
l'Expérience prouve le contraire.

Article 2.

Preuves tirées de l'Expérience.

Je n'ai détaillé la première observation
qui m'a fait naître l'idée de la dilatation.
Jusques là, je suivais, dans cette opération,
ce que m'avoient enseigné les Maîtres
de l'art, et, dans tous les cas,

3
je débarrasser toujours l'anneau ou
le ligament de Fallope.

Au mois de May 1750, je fus
appelé pour aller à trois lieues d'Orléans,
faire l'opération à un homme âgé de
27 ans. L'étranglement subsistait
depuis six jours, le malade vomissoit
les matières intestinales, il avoit le
hoquet, le pouls petit et concentré, le
ventre considérablement tendu; le tumor
étoit assez grosse et paroissoit être fermée
par l'intestin. après l'ouverture d'une
hernie et l'intestin découvert qui
étoit seul, très tendu, j'en tirai un peu
l'intestin, pour voir s'il n'étoit point
adhérent à l'anneau; par ce moyen,
j'amenai en dehors l'endroit de l'intestin
qui étoit étranglé; puis, ayant porté
le bout du doigt index de la main
gauche dans l'anneau pour servir
de conducteur au bistouri boutonné,
à l'effet de faire le débarrassement, je
m'appuyai en poussant le bout du doigt,
que l'anneau prêtoit un peu. Dans
ce moment, la dilatation graduée et



menagée que j'ai ordinairement avec
le doigt au sphincter de la vessie dans
l'opération de la taille, me revint à
l'esprit, et je pensai que je pourrois
dilater de même cet anneau, sans y
faire de débilement et sans meurtre
ni blesser l'intestin. jugeant qu'il
pouvoit y avoir de la possibilité, je
continuai d'introduire le doigt par
dégres, et je sentis que l'anneau se
dilatoit successivement et prêtoit aux
petits efforts que j'y faisois. Pendant
cette introduction, j'étois un peu avec la
main droite le paquet intestinal, afin de
l'empêcher de suivre le mouvement du
doigt, et le doigt introduit étoit posé de
manière, que sa face interne touchoit
l'intestin, qui étoit plissé dans le
passage, et l'angle regardoit la partie
supérieure de l'anneau. Dans cette
position je dilatois par degrés l'anneau,
en y introduisant successivement tout le
doigt. Au moyen de cette dilatation qui
se trouva suffisante, j'eus la facilité
de faire rentrer l'intestin de la manière

4

visitée dans cette opération. L'intestin
rentre, je pansay le malade à l'ordinaire;
les accidens cessèrent; il se sent bien
rétabli, et jouit actuellement d'une santé
parfaite.

Depuis cet Essai, j'ay fait une
autre opération sur une femme âgée de
23. ans, par la même méthode et avec
le même succès. C'étoit une hernie
Crurale, où l'intestin et l'Epiploon
étoient séparés. après la dilatation
graduelle et ménagée, je fis rentrer l'intestin
avec assez de facilité. la ligature faite
à l'Epiploon, j'emportai la portion sortie,
qui étoit un peu altérée; les accidens
cessèrent, et le malade a guéri en peu
de temps.

Qu'au mois d'août 1752, j'ay
appelé par M. Cheveneau mon élève
et mon confrère pour donner conjointem.
avec M. M. Fauvin et Dejean notre avis
sur une hernie Crurale avec étranglement.
le sujet étoit une fille âgée de 25. ans.
la hernie étoit d'un petit Volume, le
malgré tous les remèdes bien administrés,



L'Étranglement subsistoit depuis dix
jours. la malade vomissoit les matières;
le poulx étoit petit et concentré, l'entre
considérablement tendu; rien ne parois-
sant. Elle avoit des hoquets fréquents. L'opération
fut décidée sur le champ. Je proposai
à ces Messieurs d'en pointer faire le
débridement avec le tranchant de l'instrument;
de se contenter de la simple Dilatation.
Ils goûterent les raisons de préférence que
j'en apportois, et l'expérience que j'en
avois les détermina. M. Chevreau,
qui opéra avec beaucoup d'exactitude,
après avoir découvert l'intestin, —
m'engagea à porter le doigt dans le
passage de l'intestin, pour y faire la
dilatation que j'avois proposée; ce que
je fis. la Dilatation faite, il fit
revenir l'intestin avec facilité.

Le 18.^e jour l'opér. étoit parfaitement
cicatrisée, la malade partit pour la
ville de Bitzivier, lieu de sa
demeure, et ne s'en depuis ressentir de
sa hernie.

Un Marinier âgé de 50. ans,
portoit depuis dix ans une hernie —

5
Dans l'aîne, qui ne pouvoit rentrer;
Cette hernie ne l'empêchoit pas de
Vaguer à son métier. Revenant de
Nantes à Orléans, à pied, et portant
De l'argent dans son gousset, du côté
De la hernie, le poids et le frottement de
Cet argent sur la tumeur herniaire
y occasionnèrent une inflammation
considérable qui se termina par un abcès.
Ce dépôt parvenu à sa maturité, fut
ouvert: Mais quelle fut notre surprise
de trouver après l'évacuation du pus
Dans le fond Du foyer de l'abcès, une
hernie; dont le malade n'avoit rien dit.
Ce fut dans ce moment qu'il déclara qu'il
portoit cette hernie depuis dix ans.
Le pus qui avoit séjourné sur la sac
herniaire l'avoit rendu extrêmement
mince. Ceci fut ouvert; l'intestin
y étoit seul et y avoit contracté plusieurs
adhérences, qui furent disséquées avec
circonspection: L'anneau fut dilaté
au moyen de l'introduction du doigt
et l'intestin entra avec facilité. Ce
homme a guéri en peu de temps, continue
son métier, qu'on fait être soupçonné,



Sans porter de bandage, et sans que la hernie
ait depuis reparu.

Une Daigne, âgée de 30. ans, atteinte
d'une hernie avec étranglement, a été
opérée par M. Cheveneau au moyen
de la simple dilatation qu'il avoit vu
pratiquer avec tant de succès, et la
malade continue ses travaux pénibles,
sans que la hernie ait reparu.

J'en ay depuis fait en présence de
plusieurs de mes confrères deux
opérations, où j'en ai employé que la
simple dilatation, même avec les
deux doigts, un seul paroissant ne par
suffire. Les malades ont guéri
promptement, sans aucun ressentiment
ni apparence de hernie. Il est à remarquer
qu'aucune de ces personnes opérées par
la dilatation ne porte de bandage.

L'adoption faite de cette
Méthode par un grand chirurgien,
un habile Opérateur, qui est dans le
cas de la pratiquer souvent, semble encore
l'autoriser. M. Delafroix chirurgien
en chef de notre hôpital, saisissant
les raisons de préférence de la

Dilatation du col de bride, et ayant
été témoin de la plupart des succès
et des avantages rapportés dans nos
observations, j'en déterminai à le
pratiquer. Il vint se faire l'opération
le 4. 8.^{bre} 1786, dans notre hôpital, à
un homme âgé de 35 ans avec tout le
succès possible par le simple dilatation.
Jugeant qu'un doigt seul ne dilateroit
pas l'anneau suffisamment, il en
introduisit successivement deux. il fit
ensuite rentrer l'intestin avec autant de
facilité que s'il avoit fait à l'anneau
la grande incision que M. Sharp
prescrit. Une portion Epiploïque, qui étoit
de la partie, fut liée et emportée. Les
craintes cessèrent, et le malade acquiesça
en peu de temps, il en sortit de l'hôpital
le 9.^{bre} suivant.

Ceci sont, Messieurs, les
observations et les expériences qui
m'ont fait connoître la possibilité
de la Dilatation, et la préférence
qu'elle doit avoir sur la Coupe ou
le débriement.

Entrons maintenant dans



le détail des raisons qui m'ont
confirmé dans ce sentiment.

Article 3.

Preuves tirées de L'Autorité
Et de la Théorie.

Observation, L'expérience même
toutes constantes qu'elles semblent être, ne
doivent jamais faire de Règle dans un
art Scientifique, si elles ne sont guidées,
appuies et confirmées, comme j'en ay
déjà avancé, par une Saine Théorie.

1.^o Si nous parcourons la plupart des
auteurs qui ont écrit sur les plaies ou
la section des parties membraneuses
et nerveuses, nous serons pleinement
convaincus, que ces divisions quelque
petites qu'elles soient, peuvent être
suivies d'accidens.

Aussi ont-ils recommandé expressément
d'éviter autant qu'il seroit possible, de
porter le tranchant de l'instrument
sur ces parties membranéo-nerveuses
que lorsqu'il est nécessaire, dans une
opération, d'agrandir ou d'élargir

un passage, un orifice membraneux
trop étroit, comme; par exemple; —
celui de la matrice ou de la vessie; —
pour en extraire un corps étranger; —
il est préférable & beaucoup plus
avantageux d'y faire de lentes et douces
Dilatations graduées et ménagées, que
de porter l'instrument tranchant.

2.^e On sait que les parties
membrano-nerveuses sont composées
d'un tissu de fibres d'une grande
finesse, conséquemment, susceptibles
d'une prodigieuse extension. L'extrême
Dilatation ou se porte successivement
la matrice; dans la grossesse, qui se fait
sans rompre aucune de ses fibres, sans
diviser leur texture naturelle, sans blesser
ni déranger l'économie animale, en est
une preuve bien sensible. la Dilatation
successive de l'orifice de ce Viscère, dans
l'accouchement, nous fait voir que
cette Dilatation est préférable à une coupe,
ou incision qu'une main téméraire
voudrait y faire dans l'intention —



D'élargir ou d'aggrandir ce passage, afin
de faciliter la sortie de l'Enfant —
— Et Bornes que je me suis prescrites
dans ce mémoire ne permettent pas de
rapporter toutes les preuves, tirées de
l'autorité et de la Théorie, qui établissent
incontestablement la dilatabilité de
parties membranueuses * On feroit
des Volumes, si l'on vouloit démontrer
plus au long, que dans une opération
où il est question d'aggrandir une
ouverture composée de fibres d'une grande
finesse, la dilatation graduée, ménagée
et successive est préférable à l'incision.

3.^e Pour prouver encore mieux la
possibilité et la préférence de la Dilatation,
faisons une succincte exposition anatomique
de la composition et de l'arrangement des fibres
de l'anneau que je propose de dilater.

Cet anneau est essentiellement composé de fibres
membranueuses. la bande aponeurotique
qui part du muscle Grand oblique,

* Voyez le Mémoire que en. Le Cat mia
adressé en 1748. inséré dans la 2.^e Partie
de son Recueil, sur la Taille, et que j'ay
communiqué dans le même à l'Académie.

Descendant vers le Subis, se divise en deux bandes; une supérieure ou antérieure, l'autre inférieure ou postérieure.

La bande supérieure traverse la Symphyse, et va s'attacher à l'os Subis de l'autre côté, en se croisant avec la bande opposée. La bande inférieure va plus bas s'attacher à la partie moyenne de la Symphyse.

(Ces deux bandes forment une ouverture ovale, plus étroite en bas, plus large en haut, arrondie en manière d'anse, à laquelle on a donné le nom d'anneau. Cette anse, cette portion d'anneau, est formée, dans l'adulte, de plusieurs fibres aponeurotiques qui se détachent obliquement de côté et d'autre. Il est essentiel de remarquer que ces fibres collatérales, qui se détachent obliquement pour venir former le petit bord arrondi, ou cette portion d'anneau, ne paroissent guères dans l'enfant*.

4.^e Cet Exposé anatomique fait voir que dans la dilatation, il n'y a que cette portion d'anneau, ce petit bord arrondi, formé par les fibres Collatérales dont

* Exposition Anat. de M. Winslow. Trait. de l'Anat.

Je Viens de parler, qui puisse s'opposer
à la dilatation. Cette résistance des fibres
collatérales est aisément vaincue par
l'introduction du doigt, comme l'expérience
nous l'a fait connoître dans les observations
cy dessus rapportées. Si ces fibres collatérales
manquoient dans l'adulte, ou qu'elles ne
paraissent guères, comme dans les Enfans,
les hernies seroient plus communes
parce que les fibres longitudinales qui
composent les deux bandes aponeurotiques,
de même des collatérales, ne sont dans
les parties supérieures de l'ouverture qu'elles
forment, qu'adosées l'une à l'autre. On doit
sentir dans ce cas, que cet adossement
de fibres résisteroit peu à la dilatation
de cette ouverture, et opposeroit une
bien faible résistance à la sortie des
parties flottantes.

Plus le sujet sera jeune, plus encore,
cette portion d'anneau qui forme l'embou-
chure; puisque dans les Enfans les fibres
qui le composent ne paroissent guères,
et c'est directement la principale raison
pour laquelle les Enfans sont plus
sujets aux hernies que les adultes.

(Les fibres Collaterales ne se forment
donc, pour ainsi dire, et n'acquiescent
à la fermeté qu'avec l'âge; elles
deviennent dans la Vieillesse quelquefois
Cartilagineuses ou osseuses; aussi
l'Étranglement qui arrive aux hernies
des Vieillards est-il souvent mortel.

5.° Si ceux qui ont souffert l'opération
par le débrièvement, sont, pour la plus part,
dans la nécessité de porter le bandage,
C'est que les fibres Collaterales, qui ferment
le bord ou l'anneau de l'anneau, ont été
coupées, et que par cette coupe, les bords
de la Division se sont éloignés du Centre,
comme il arrive toujours à la Section
des parties membraneuses, et on laisse
cette ouverture dénuée de ses fibres
collaterales, qui dans l'adulte resserrent
l'anneau, et conséquemment s'opposent
à la sortie des parties sortantes du
Bas Ventre.

La Section ou le débrièvement de
l'anneau rend donc cette ouverture
semblable à celle des enfans, où les
fibres Collaterales ne paroissent guère.
D'où l'ouverture plus lâche et plus
grande, la sortie facile des parties



flottantes, et la nécessité de porter le bandage.

6.^o Il n'en est pas de même dans la dilatation; ces fibres étendues, allongées par degrés, semblables à celles de la matrice, ou autres parties membranueuses, portées à une extension ou dilatation même considérable, reprennent successivement, leur longueur, leur ton et leur ressort naturel. ainsi les personnes qui ont donné lieu à nos observations, ne sont pas obligées de porter le bandage, comme celles qui ont souffert le débilement; parceque d'un côté les fibres qui forment ce bord arrondi, cette portion d'anneau, sont restées entières; et d'un autre côté, la cicatrice, qui se colle dessus, forme, non seulement, un bouton solide, qui s'oppose à la sortie de l'artère flottante; mais encore, lie, serre et enchaîne pour ainsi dire, ces fibres collatérales, et leur donne conséquemment plus de fermeté, plus de résistance.

7.^o J'ay cru longtems que l'étranglement dans une hernie étoit causé par l'inflammation de

12
L'anneau la Saison et l'Expérience)
m'ayant fait revenir de cette Erreur,
j'ay jugé, au contraire, que l'Etranglement
étoit principalement causé par la tension,
le gonflement et l'inflammation de
parties qui forment la hernie. Si
l'anneau n'est point enflammé, et que
la prétendue inflammation qu'on y a
longtemps soupçonnée, ne soit pas la cause
de l'Etranglement, il prétera d'autant plus
à la Dilatation.

Les Praticiens remarqueront que
l'anneau fait moins de résistance à la
dilatation graduée et ménagée, que le col
de la Vessie n'en oppose à la même Dilatation,
dans l'opération de la taille au grand
appareil, où l'on sait que le col de la
Vessie n'est, le plus souvent, ni coupé ni
sébré.

Si l'anneau est susceptible d'une
Dilatation suffisante et aussi étendue
que l'ouverture qui lui seroit procurée
par la coupe ou le sébréement, comme
l'Expérience et la Théorie nous
l'apprennent, la Dilatation doit, sans
contredit, être préférée à toute incision.



Outre ces avantages, Combien
d'accidents n'éviterois-on pas par cette
Méthode? j'ay vu de grands
Chirurgiens ouvrir l'intestin en faisant
le débordement: on ne connoit que trop les
suites fâcheuses d'un pareil accident. —

8°. La simple Exposition Anatomique
de l'anneau crural, ou se forme le hernier
devenant, fait voir quelle dilatation s'y
exécute encore plus aisément et plus
facilement qu'à l'anneau inguinal. elle
est principalement composée du ligament
inguinal ou ligament de Fallope, par dessous
lequel passent les vaisseaux cruraux. Cette
grande ligamenteuse et opposée à la tige est tendue
entre l'épine antérieure supérieure de l'os
des Iles et l'épine de l'os Pubis où elle
est attachée.

Il faut remarquer que cette grande
est fort étroite le long de ses parties
moyennes et qu'elle s'élargit considérablement
vers ses extrémités; qu'il y a au dessous
un tissu cellulaire assez ample, qui
prête au côté à une légère pression;
qu'il n'y a point de fibres collatérales,

comme à l'anneau, qui viennent fortifier
l'ouverture par ou passent les parties
qui forment la hernie, ce qui fait que
cette ouverture prête d'avantage à la
dilatation. La plus grande dilatation
s'opère sur les côtés dans le tissu
cellulaire, et en levant un peu vers le haut,
la partie la plus étroite de cette bourse,
où se fait ordinairement la hernie, on
agrandit suffisamment cette ouverture,
pour y faire rentrer les parties sorties.

La même Expérience, la même
théorie, confirment donc comme à la
hernie inguinale la possibilité et
conséquemment la préférence de la dilatation
graduelle et ménagée que je propose pour
cette opération.

Toutefois, si qu'on pourra tirer un peu
le paquet intestinal, qui forme la hernie
afin d'amenner et mettre hors de l'anneau
l'encroûtement et l'intestin étranglé, comme
j'en ay écrit dans la première observation
et exécuté dans toutes les autres, il
faudra préférer la dilatation à l'incision.
Un Chirurgien timide craindra



peut être de blesser l'intestin, en introduisant
le doigt dans l'anneau. s'il a l'attention,
comme nous venons de le dire, d'amener
et mettre hors de l'anneau l'écroût
et l'intestin étranglé, et de ne laisser
dans le passage qu'une portion d'intestin
qui n'aura point souffert de compression,
il est sûr que le doigt introduit par
dégres ne meurtrira ni ne blessera
l'intestin, quoique l'anneau semble
ne vouloir pas d'abord céder en
première tentative.

C'est sans doute cette première
résistance qui a fait penser aux Maîtres
de l'art qu'il n'y avoit pas d'autre moyen
pour agrandir ce passage, que la coupe
ou le débrièvement, dans la crainte qu'ils
avoient de meurtrir l'intestin resté dans
le passage. mais, avec les attentions
et les précautions que nous venons de
prescrire, cette première résistance sera
aussément vaincue; et de quelle fibres
collatérales. dont j'ai parlé, commencerons
à s'étendre, à s'allonger, et que l'anneau
fera seulement agrandi d'une demi ligne;

on sentira alors que l'anneau s'étend
et prête avec facilité aux petits efforts
qu'on fait pour le dilater.

9.^o Il peut se trouver en Cas ou la
dilatation quoique possible, ne soit pas
suffisante, pour faire rentrer un très gros
Volume d'intestin. j'en ay un Exemple dans
une opération faite dans notre hôpital
par M. Dela Croix. Le Sac ou le noue
fit voir que cette grosse hernie étoit formée
de toute la poche Cecale, d'une grande
portion du Colon et d'une plus grande de
l'Uterus; nous ne pûmes faire rentrer ce
gros Volume d'intestin 1.^o qu'en débridant
suffisamment l'anneau, 2.^o en comprimant avec
les deux mains le paquet intestinal, afin
d'en chasser l'air et de le faire rentrer dans
la continuité du Colon: Ces intestins vidés
d'air, étant moins gros, occupant moins d'espace,
ont été remis dans la capacité
Le malade a guéri; mais la hernie est
et rentre avec facilité; elle est maintenue
avec un bon Bandage.*

* Je puis raisonnablement presumer que si nous
avions été munis du Dilatatoire dont La
Description doit terminer ce Mémoire, il
nous auroit procuré une Dilatation suffisante
sans être obligés de faire de Débridement.



Le Débridement est encore préférable
à la Dilatation lorsque l'intestin est
contracté des adhérences à la circonférence
de l'anneau.

La Dilatation sera souvent impossible,
dans la Vieillesse, parce que l'anneau se
trouve quelquefois dans les personnes âgées
Cartilagineux ou osseux. mais il suffit
que la Dilatation réussisse dans les cas
les plus ordinaires, tels que ceux que
nous avons rapportés, pour en établir
non seulement la préférence, mais encore
la nécessité.

Joins à ce mémoire la description
d'une espèce de Dilatatoire, qui sans
meurtre ni blesser l'intestin, procurera
autant d'étendue et d'agrandissement
quels coups ou le Débridement.

Description Et Usage de cet Instrument.

Cet Instrument figure 1.^{re} est proprement
le Gorgere Dilatoire connu des Lithotomistes
et que nous avons rendu propre à la
Dilatation de l'anneau inguinal par
quelques changements dans sa construction.

Il est composé de deux branches A, B.
jointes ensemble par une charnière C, -
traversée par une Vis qui sert d'axe
à la Charnière.

La fanelure D, depuis la charnière C,
jusqu'à l'extrémité de l'instrument terminée
par une soule plate et mousse E, forme
une courbure dont la convexité est du côté
de la fanelure du Gorgere, et la concavité
du côté opposé.

Le Ressort F, qui est assujéti par la Vis
G, tient les deux branches A, B jointes
ensemble de manière qu'elles ne forment
qu'un tout.

On ouvre l'instrument, comme
on le voit dans la figure II. qui le représente
vu du côté opposé à la fanelure, en
serrant les poignées H, I, de la main droite
qui l'embrasse,

La branche A, figure II est terminée
par un plan oblique L, qui va se loger
et s'ajuster avec son parallèle M, de la
branche B, quand l'instrument est tenu
fermé par le ressort F, comme il est
représenté dans la figure 1.^{re}

La courbure de la branche de l'instrument
depuis la charnière C, jusqu'à



L'extrémité de la sonde plate E. est
semblable à la portion d'un Corde de
six pouces et demi de diamètre. Si
cet instrument étoit droit, l'introduction
en seroit plus difficile et il pourroit
mourir ou blesser l'intestin.

Toutes les arêtes de ces branches sont
bien émoussées, arrondies et polies, afin
d'être hors d'état de blesser aucune partie
quand on les ouvre.

Pour se servir de cet instrument, il faut
que les deux branches soient bien assujetties
par le ressort F. mis dans sa position
comme dans la figure 1.^{re} et afin que la
froideur naturelle du feu ne cause aucune
lésion aux parties que l'instrument
doit toucher, on aura l'attention de tenir
l'instrument pendant le temps qu'on
prépare l'appareil, dans la poche de sa
culotte, ou entre la chemise et la veste
afin qu'il y perde cette froideur naturelle,
et qu'il y soit doucement échauffé, comme
une clef l'est ordinairement dans la
poche de la Culotte.

Après avoir tiré la portion intestinale
étranglée, et mis dans le passage une portion

14
D'intestin qui ne peut souffrir
D'étranglement, on prend l'instrument,
bien fermé par son ressort, de la main droite,
et on le tient à peu près comme une plume
à écrire, le pouce appuyé sur la partie O,
et la branche B, figure II, le doigt index
et du milieu sur la partie P, P, de la branche
A, l'annulaire et le petit doigt par dessous.
Dans la canelure de Gorgoret; la portion
du manche I, posée le long de
l'articulation et l'index avec le métacarpe
et l'autre portion H, le long de la seconde
phalange du pouce.

L'instrument tenu dans cette position,
on trempe l'extrémité dans l'huile et on
l'introduit dans la partie supérieure de
l'anneau, de la même manière qu'on y
introduit la sonde canelée, quand on
se sert de cette sonde pour le débouchement.

On insinue l'instrument par gradation,
jusqu'à ce qu'il soit entré environ de deux
pouces, et même davantage si on le
juge nécessaire.

Alors, en écartant le ressort, on le pousse
avec le doigt pour le mettre dans la position
où il parait dans la figure II, puis la
portion du manche I. appuyée sur le Ténar,



le ponce. Sur la Charnière C, et les quatre
Doigts le long de la portion H; Cette poignée
ainsi embrassée avec la main est serrée
par l'égrèr, ce qui produit l'écartement
des branches, et opère la Dilatation.

Dès que l'anneau commence à prêter aux
petits Efforts qu'on fait pour le Dilater,
on pousse l'instrument plus avant afin
de faire une Dilatation plus douce et plus
amplie, en serrant ensuite le manche
successivement et par l'égrèr.

Pendant toute cette manœuvre, le paquet
intestinal qui forme la hernie est tenu
se la main gauche, et la portion d'intestin
qui est dans le trajet de l'anneau est
logée dans la fanelure du Gorgere, de façon
que cette portion ne peut en aucune manière
être meurtrie ni blessée. La Dilatation
jugée suffisante, on retire l'instrument,
et l'on fait rentrer l'intestin de la manière
usitée dans cette opération.

Le Renon F, ne sert que pour bien
assujettir les deux branches A, B, l'une
contre l'autre, afin de pouvoir introduire
l'instrument, comme il étoit d'une seule

pièce. Il est bien Essentiel, comme je
l'ai déjà dit de débarrasser le ressort, en
le mettant dans la position où il paroît
dans la figure II, avant de faire aucun
mouvement pour serrer le manche, —
parce que si le ressort restoit bandé —
pendant qu'on serre le manche, —
l'instrument pourroit pincer ou déchirer
l'intestin sans qu'on s'en apperçût. On
ne doit point craindre cet inconvénient
si l'on a l'attention de débarrasser le
ressort avant de faire aucun mouvement
pour serrer le manche.

Je m'attens que ce mémoire trouvera
des contradicteurs. Les plus utiles
découvertes sont ordinairement les plus
contredites; malgré leur perfection.
Mais elles peuvent être susceptibles
des avantages qui en résultent et
qui doivent leur donner la
préférence, elles essuient ces
contradictions enfantées par la
prévention, le préjugé et l'habitude.
L'illustre Lavoisier nous fournit un
exemple de cette prévention; il a
combattu pendant plus de vingt années

No 98.


avec deux dessins

pour convaincre ses adversaires
que la ligature des vaisseaux dans
les amputations, dont il est l'inventeur,
est infiniment préférable à la Cauterisation.
Ces qui paroîtront les plus opposés
à la Méthode que je propose
sont priés de suspendre leur
jugement jusqu'à ce qu'ils l'aient
pratiquée.

fin.



Fig. II.






fig. 1.^{ere}

